

# Impfkalender<sup>1</sup> für Jugendliche und Erwachsene<sup>6</sup>

	9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	Ab 18 Jahre	Ab 60 Jahre
	U11/J1		J2		
Tetanus Diphtherie Keuchhusten (Pertussis) Kinderlähmung (Polio)	<b>1 Auffrischimpfung</b> als Vierfach-Impfung			<b>1 Auffrischimpfung</b> als Dreifach-Impfung <sup>(7)</sup> (Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) Ausdrücklich empfohlen ist die Keuchhusten-Impfung für Schwangere in jeder Schwangerschaft sowie für enge Haushaltskontaktpersonen und Betreuende eines Neugeborenen <sup>(8)</sup>	
Masern Mumps Röteln	<b>2 Nachholimpfungen<sup>(2)</sup></b> als Dreifach-Impfung			<b>Masern-Impfung</b> 1 Impfung <sup>(9)</sup> für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen als Dreifach-Impfung <b>Röteln-Impfung</b> 2 Impfungen <sup>(10)</sup> für alle Frauen im gebärfähigen Alter	
Windpocken	<b>2 Nachholimpfungen<sup>(3)</sup></b>			<b>2 Impfungen</b> Für alle ungeschützten Frauen mit Kinderwunsch	
Hepatitis B	<b>3 Nachholimpfungen<sup>(2)</sup></b>			<b>1 Impfung</b> für im Säuglingsalter gegen Hepatitis B geimpfte Personen mit neu aufgetretenem Hepatitis B-Risiko mit anschließender Kontrolle <sup>(1)</sup>	
Meningokokken C	<b>1 Nachholimpfung<sup>(2)</sup></b>				
Gebärmutterhalskrebs <sup>(4)</sup> (und andere durch HPV verursachte Tumore)	<b>Standardimpfung Mädchen und Jungen</b> 9–14 Jahre <b>Nachholimpfung Mädchen und Jungen</b> 15–17 Jahre				
Grippe (Influenza)	<b>1 Impfung jährlich</b> Für alle chronisch Kranken Für alle Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel <sup>(5)</sup>				<b>1 Impfung jährlich im Herbst</b>
Pneumokokken	Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Gefährdung infolge einer Grunderkrankung <sup>(1,11)</sup>				<b>1 Impfung<sup>(12)</sup></b>
Gürtelrose (Herpes Zoster)				<b>bei Risikopersonen<sup>(13)</sup></b>	<b>2 Impfungen<sup>(14)</sup></b>
COVID-19 ( <u>ohne</u> Grunderkrankung)				<b>Basisimmunität<sup>(15)</sup></b>	<b>Basisimmunität<sup>(15)</sup> und jährliche Impfung im Herbst</b>
COVID-19 ( <u>mit</u> Grunderkrankung) <sup>(1)</sup>	<b>Basisimmunität<sup>(15)</sup> und jährliche Impfung im Herbst</b>				

- Gemäß Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), Stand Januar 2024, Quelle: Epidemiologisches Bulletin 04/2024
- Für bisher nicht geimpfte Kinder und Jugendliche
- Ungeimpfte ohne durchgemachte Windpockenerkrankung
- Je nach Alter bei der ersten Impfung sind 2 oder 3 Dosen notwendig
- Bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab dem 1. Schwangerschaftsdrittel
- Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden
- Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV

- Schwangere sollen zu Beginn des 3. Trimenons, bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt im 2. Trimenon, unabhängig vom Abstand zu einer vorher verabreichten Pertussis-Impfung geimpft werden. Enge Haushaltskontaktpersonen (inkl. Freunde) und Betreuende eines Neugeborenen alle 10 Jahre.
- Bei unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- Ungeimpfte oder Frauen mit unklarem Impfstatus bzw. einmalig bei einmaliger Vorimpfung
- Kinder ≥ 2 Jahre, Jugendliche: Sequenzielle Impfung mit PCV13 oder PCV15, gefolgt von PPSV23 nach 6–12 Monaten. Aufgrund der begrenzten Dauer des

Impfschutzes soll die Impfung mit PPSV23 in allen drei Risikogruppen mit einem Mindestabstand von 6 Jahren wiederholt werden.

- Impfung mit PCV 20
- Bei Personen ab 50 Jahren mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung für das Auftreten von Gürtelrose infolge einer Grunderkrankung
- Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist.



## Ist Ihr Impfschutz ausreichend?

Bringen Sie bei Ihrem nächsten Arztbesuch Ihren Impfausweis mit und lassen Sie Ihren Impfstatus überprüfen.



## Denn Vorsorge ist wichtig für den Schutz vor Krankheiten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet:

Informationen über Impfungen

[www.impfen.de](http://www.impfen.de)

Reisemedizin

[www.bereit-zu-reisen.de](http://www.bereit-zu-reisen.de)



## Fremdsprachiges Material zur Impfaufklärung

Ihr praktischer Impfservice – als QR-Code verfügbar:



Impfkalender in  
20 Sprachen (RKI)  
Vaccination calendar in  
20 languages (RKI)



MMR-Impfung  
Combination vaccine:  
measles, mumps, rubella



Hepatitis-A-Impfung  
Hepatitis-A vaccine



Influenza-Impfung  
Flu vaccine



Pneumokokken-Impfung  
Pneumococcal vaccine



Herpes zoster-Impfung  
Herpes zoster vaccine



COVID-19