


# Impftermine für Ihr Kind

gemäß Impfkalender der STIKO<sup>(1,2)</sup> für Säuglinge, Kinder und Jugendliche



Impfungen	Alter in Wochen 6	Alter in Monaten <sup>(3,4)</sup>									Alter in Jahren <sup>(3,4)</sup>				
		2	3	4	5–10	11 <sup>(8)</sup>	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16
		U4			U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	
Grundimmunisierung – Rotaviren		<b>1. Impfung***</b>	<b>2. Impfung</b>	<b>(3. Impfung)</b>											
Grundimmunisierung* – Tetanus <sup>(7)</sup> – Diphtherie <sup>(7)</sup> – Keuchhusten <sup>(7)</sup> – Haemophilus influenzae Typ b (Hib) <sup>(7)</sup> – Kinderlähmung <sup>(7)</sup> – Hepatitis B <sup>(7)</sup>		<b>1. Impfung</b>		<b>2. Impfung</b>		<b>3. Impfung<sup>(9)</sup></b>							<b>1. Auffrischung</b> – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten		<b>2. Auffrischung</b> – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung
Pneumokokken <sup>(4,7)</sup>		<b>1. Impfung</b>		<b>2. Impfung</b>		<b>3. Impfung<sup>(9)</sup></b>									
Meningokokken B <sup>(10)</sup>		<b>1. Impfung</b>		<b>2. Impfung</b>			<b>3. Impfung</b>								
Meningokokken C							<b>1. Impfung</b>								
Grundimmunisierung** – Masern – Mumps – Röteln – Windpocken						<b>1. Impfung</b>			<b>2. Impfung<sup>(5,6)</sup></b>						
– Gebärmutterhalskrebs und andere durch HPV verursachte Tumore														<b>Mädchen und Jungen 9–14 Jahre</b> <b>2 Impfungen:</b> 0 und 6 Monate. <b>Mädchen und Jungen 15 Jahre und älter</b> <b>3 Impfungen:</b> 0-1-(2)-6 Monate	

\* möglich mit 6fach-Kombinationsimpfstoff. – \*\* möglich mit 4fach-Kombinationsimpfstoff bzw. bei 1. Impfung mit MMR- und V-Impfstoff zeitgleich. – \*\*\* Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

1. Gemäß den Impfeempfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), Stand Januar 2024. Quelle: Epidemiologisches Bulletin 04/2024. – 2. Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden. – 3. Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres. – 4. Koadministrationsmöglichkeiten vgl. Fachinformation. – 5. Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen. – 6. Impfung entsprechend Herstellerangaben. – 7. Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen; Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft. – 8. Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden. – 9. Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate. – 10. Gemäß Fachinformation besteht die Impfsreihe im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen.

Fremdsprachiges Material zur Impfaufklärung –  
Ihr praktischer Impfservice\*:



**Impfkalender in  
20 Sprachen (RKI)**  
*Vaccination calendar  
in 20 languages (RKI)*



**6fach-Impfung**  
*6-in-1 vaccine*



**Windpocken-Impfung**  
*Chicken pox vaccine*



**Tdap-IPV-Impfung**  
*Combination vaccine:  
Tetanus, diphtheria,  
whooping cough, polio*



**MMR-Impfung**  
*Combination vaccine:  
measles, mumps,  
rubella*



**Influenza-Impfung**  
*Flu vaccine*



**Pneumokokken-  
Impfung**  
*Pneumococcal vaccine*



**Rotavirus-Impfung**  
*Rotaviruses vaccine*



**Hepatitis-A-Impfung**  
*Hepatitis-A vaccine*



**Meningokokken-B-  
Impfung**  
*Meningococcal  
disease vaccine*



**Meningokokken-C-  
Impfung**  
*Meningococcus C  
vaccine*



Download a  
QR-Code  
App

And get  
informed about  
vaccination!

\* Quelle: RKI (www.rki.de)

