

Impftermine für Ihr Kind

gemäß Impfkalender der STIKO^(1, 2) für Säuglinge, Kinder und Jugendliche



Impfungen	Alter in Wochen	Vollendeter Lebensmonat ^(2,3,4)									Vollendetes Lebensjahr ^(2,3,4)				
	6	2	3	4	5–10	11 ⁽⁸⁾	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16
			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	
Grundimmunisierung*** – Rotaviren		1. Impfung	2. Impfung	(3. Impfung)											
Grundimmunisierung* – Tetanus ⁽⁷⁾ – Diphtherie ⁽⁷⁾ – Keuchhusten ⁽⁷⁾ – Haemophilus influenzae Typ b (Hib) ⁽⁷⁾ – Kinderlähmung ⁽⁷⁾ – Hepatitis B ⁽⁷⁾		1. Impfung		2. Impfung		3. Impfung ⁽⁹⁾						1. Auffrischung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten		2. Auffrischung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung	
Pneumokokken ^(4,7)		1. Impfung		2. Impfung		3. Impfung ⁽⁹⁾									
Meningokokken C							1. Impfung								
Grundimmunisierung** – Masern – Mumps – Röteln – Windpocken						1. Impfung			2. Impfung ^(5,6)						
– Gebärmutterhalskrebs und andere durch HPV verursachte Tumore														Mädchen und Jungen 9–14 Jahre 2 Impfungen: 0 und 6 Monate. Mädchen und Jungen 15 Jahre und älter 3 Impfungen: 0-1-(2)-6 Monate	

* möglich mit 6fach-Kombinationsimpfstoff. – ** möglich mit 4fach-Kombinationsimpfstoff bzw. bei 1. Impfung mit MMR- und V-Impfstoff zeitgleich. – *** 2 oder 3 orale Gaben je nach verwendeten Impfstoff.

1. Gemäß den Impfeempfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), Stand August 2020. Quelle: Epidemiologisches Bulletin 34/2020. – 2. Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden. – 3. Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres. – 4. Koadministrationsmöglichkeiten vgl. Fachinformation. – 5. Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen. – 6. Impfung entsprechend Herstellerangaben. – 7. Frühgeborene (Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche) sollen mit insgesamt 4 Impfstoffdosen im Alter von 2, 3, 4 und 11–14 Monaten (3+1-Impfschema) geimpft werden. – 8. Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden. – 9. Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.